Black bear

Environment Canada Environnement Canada

Canadian Wildlife Service Service canadien de la faune

A member of the Conservation and Protection family

How to distinguish a black bear from a grizzly

Black bear



Grizzly



The black bear *Ursus americanus* is one of the most familiar wild animals in North America today. To many campers it is both a nuisance and an exciting part of their outdoor experience. Most visitors to Canada's provincial and national parks are disappointed if they fail to catch a glimpse of a bear.

Black bears are members of the family Ursidae, which has representatives throughout most of the northern hemisphere and in northern South America. Other members of this family that occur in North America are grizzly bears and polar bears. Both of these species are considerably larger than the black bear.

Widely distributed in North America, the black bear occurs from the east to the west coast, as far north as Alaska and as far south as Mexico. It is not found on Prince Edward Island, in northern Alberta, northern Saskatchewan, or in extreme northern Ontario. The map provides a rough outline of its range.

Although found in a variety of habitats, the black bear prefers heavily wooded areas and dense bushland. Maximum numbers are probably attained in areas of mixed coniferous–deciduous forests. Densities in favourable habitats are one bear to every 3–4 km^2. Black bears are difficult to census because they are shy and secretive. A recent estimate of the continental population is 500 000, give or take 200 000!

Description

The black bear is a bulky and thickset mammal. Approximately 150 cm long and with a height at the shoulder that varies from 100 to 120 cm, an adult black bear has a moderate-sized head with a rather straight facial profile and a tapered nose with long nostrils. Its lips, unlike those of other animals such as the wolf or bobcat, are free from the gums and can be manipulated with amazing dexterity. This adaptation and a long manipulative tongue greatly assist the bear when it feast on tiny blueberries or even tinier ants. The ears are rounded and the eyes small. The tail is very short and inconspicuous.

A black bear has feet that are well furred, on which it walks like a human being with the entire bottom portion of the foot touching the ground.

Range of the black bear

Each foot has five curved claws, which it cannot sheathe. These are very strong and are used for digging and tearing out roots, stumps, and old logs when searching for food.

Owing to their compactness, bears often appear much heavier than they really are. Adult males weigh about 135 kg, although exceptionally large animals weighing over 290 kg have been recorded. Females are much smaller than males, averaging 70 kg.

The normal colour is black with a brownish muzzle and frequently a white patch below the throat or across the chest. Although black is the most common colour, other colour phases such as brown, dark brown, cinnamon, blue-black, and even white also occur. Albinos are rare. The lighter colour phases are more common in the west and in the mountains than in the east. Any of these colour phases may occur in one litter, but generally all cubs in a litter are the same colour as their mother.

The eyesight of the black bear is relatively poor, but its senses of hearing and smell are well developed. A startled animal will usually attempt to get downwind from an intruder and make an identification by smell. Under favourable atmospheric conditions bears can detect carrion, which they scavenge, at considerable distances. Frequently, a black bear will stand on its hind legs with its nose in the air and scent the wind for any delectable odours.

Black bears appear awkward as they shuffle along, but can move with amazing speed when necessary. For short distances they have been clocked at speeds of up to 55 km/h. They are good swimmers and frequently cross rivers and small lakes.

Climbing is second nature to a black bear. Young animals readily take to trees when frightened. They climb with a series of quick bounds, grasping the tree with their forepaws and pushing with their hind legs. When descending they travel backwards, frequently dropping from the tree from heights up to 4.5 m. Once on the ground, they quickly disappear into the underbrush, apparently unshaken by the abrupt descent.

Although it is rarely heard, the black bear has several distinct calls. These include a growl of anger, a whining call, and sniffs of many sorts. A female with cubs may warn them of danger with a loud "woof-woof" and call them in with a whining or whimpering sound. The cry of a young cub in trouble is similar to the crying of a human baby.

Life history

Black bears are solitary animals, except for the close bond between females and cubs, and the pairing that takes place during the mating season. Mating is in June or early July, and the cubs are born the following January or February while the mother is still in her winter den.

Generally, two cubs are born, although there may be only one or as many as four. At birth they are 15–20 cm long and weigh slightly more than 225 g. Compared to other mammals, this is very small relative to the mother's weight. For example, a woman weighing 70 kg could expect her infant to weigh about 3 kg, 12 times the mass

Bear tracks



of the newborn bear! The young bears grow rapidly and are quite active by the time they leave the den with their mother in the spring. At one year they weigh from 13 to 27 kg but only slightly more at two years. Normally, young bears remain with their mother until they are 16–17 months old. Cubs orphaned during their first summer have about a 30% chance of surviving to independence compared to about an 80% chance for those with mothers.

Males and females may attain sexual maturity between their third and fourth years in captivity, but often later in the wild. Male bears continue to grow until their seventh year; females cease growth somewhat earlier. Bears have lived for 25 or 30 years, but most animals in the wild would be less than 10 years old.

In the autumn when days become shorter and temperatures cooler, bears begin to search for a denning site. A suitable site may be under a tree stump or over-turned log, or in a hole in a hillside. Most dens are only large enough to accommodate a bear when it is curled up. Generally, females line their dens with grass, ferns, or leaves, but males usually do not. Females usually den earlier, males frequently wait until the first snowfall before entering a den.

Recent studies of black bear physiology have shown that denned bears show some characteristics of true hibernators. Although body temperatures are only slightly lower, heart rates are greatly reduced. In addition, unlike many small mammal hibernators, bears do not have to eat or eliminate waste, but subsist entirely on their stored fat. However, black bears are not true hibernators, and most bears can be aroused if prodded sufficiently. If the weather becomes exceptionally warm some bears may wake up and wander around for short periods during the winter months.

With the coming of spring and warmer weather, bears emerge from their dens and search for food. During the winter they may have lost up to 30% of their pre-denning weight. Most bears continue to lose weight during the early summer period until mid-July when quantities of berries start to become available.

Travel and feeding habits

Black bears are capable of travelling great distances—biologists who have live-trapped bears and removed them 80 km or more from their home ranges have sometimes been surprised by the bears' return. The home ranges of females are usually quite restricted. Ranges of adult males encompass several female ranges. Like most animals, they have customary routes of travel, which they regularly follow as they move from one area to another. Old-time bear hunters took advantage of this and frequently set their traps along these well-used trails.

The activity pattern of black bears varies from area to area depending on a number of factors, including human activities. In wilderness areas they are usually most active from dawn until dark, whereas bears in areas with high human activity may be mainly nocturnal to avoid contact with people. Of course, some individuals solicit human contact in hopes of obtaining a free meal.

Black bears are omnivorous and will eat almost anything available. Most of their food is vegetation, especially in the late summer and autumn when berries and nuts are available. Favourite fruits include blueberries, buffalo berries, strawberries, elderberries, saskatoons, black cherries, and apples. Acorns, hazelnuts, and beechnuts are other preferred foods. Insects such as ants and grasshoppers rate high, and black bears will overturn logs, old stumps, and stones while foraging.

Fish, small mammals, and occasionally birds are also on the black bear's menu. In the spring some bears may prey upon newborn moose calves, deer fawns, caribou calves, or elk calves. Carrion of any sort is highly prized and its attractiveness to a bear increases with its degree of decomposition. Of course a tree containing honey is always a treat. Bears drink frequently and are usually found in the vicinity of water.

Causes of death

Although some black bears may live for 20–25 years, few bears in the wild become that old. In areas where bears are hunted, legal hunting is one of the major mortality factors, especially for bears two years of age and older. Males are usually shot before females because they are less cautious and travel more widely. Females become more vulnerable with increased hunting pressure. Young bears in both hunted and unhunted populations die from starvation, accidents, and predation. Predators include older bears and occasionally wolves and lynx.

Recently, the increasing demand for bear gall bladders, bear paws, and other parts that are believed to have medicinal and aphrodisiacal value has caused concern about increased illegal killing of bears. In certain parts of the world a dried gall from a wild bear may sell for up to $50 000.

Some black bears harbour parasites such as tapeworms and roundworms, but these seem to have little effect on the bear's health. In general, wild black bears have remarkably few internal or external parasites. From a public health viewpoint, trichinosis, which is caused by a nematode or roundworm, is probably the most important parasite of bears. As people can become infected, all bear meat should be cooked carefully before consumption.

Relationship to people

The attitude of people towards bears has always been one of caution, respect, and, in primitive times, even reverence. Many Amerindians have special veneration for the bear, and any hunter who kills a bear commands considerable respect.

In the early days of European settlement, "bear hunters" made their living hunting and trapping bears, wolves, and cougars because of their presumed danger to livestock and perhaps people. In fact, most black bears kill few large mammals and can not be classified as predators in the same manner as wolves, weasels, or polar bears. They are now prized as game animals, because they are large and elusive and test the skills of hunters and

104-01123/

Bear trees

Biologists think that trees repeatedly clawed and marked by bears serve as a form of communication. Adult males use these trees most frequently, presumably to advertise their presence to potential mates or potential rivals. Most markings are done during the breeding season in late spring or early summer (from mid-June to mid-July).



because bear meat if properly prepared is considered highly palatable by many fanciers of wild game.

At this time in Canada and Alaska there are two legal hunting seasons for black bears, spring and fall; however, most jurisdictions in the lower 48 states no longer allow bear hunting in spring because of overharvest.

Black bears are extremely fond of garbage and frequently congregate at dumps. This habit occasionally leads them into contact with people who enjoy observing the feeding antics of the bears, especially the younger ones. Of course, if the bears demolish some picnicker's lunch, this feeding behaviour is not thought so amusing.

Most bears are extremely shy and retiring and usually avoid direct contact with humans. Incidents of black bears attacking humans have been reported but are extremely rare. These attacks were usually made by bears that had been feeding on garbage or by animals in extremely poor physical condition due to old age, disease, or wounds.

Occasionally bears cause trouble when they prey on livestock or upset beehives in an apiary. Usually incidents of this type are caused by one or two individuals and the problem is solved by their removal.

When people watch bears in the wild they should never forget that these are wild animals that must be treated with caution. They should not be fed. Most bears will hastily retreat if a person approaches too closely, but one should not take unnecessary chances, as bears, like people, are sometimes unpredictable. They are interesting to observe and photograph, but they can be dangerous at close quarters.

In 1992, to limit illegal killing of black bears and international trafficking in gall bladders from wild bears (including endangered Asian bears), the 115 countries (including Canada) that were Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) voted to list the black bear on Appendix II to the Convention. Since that date, a hunter wishing to transport any part of a black bear through customs of any country that is a member of CITES has had to obtain a CITES export permit from the exporting country.

Reading list

Banfield, A.W.F. 1974. The mammals of Canada. University of Toronto Press. Toronto.

Burk, D., editor. 1979. The black bear in modern North America. The Amwell Press. Clinton, N.J.

Fair, J. 1990. The great American bear. Northword Press Inc. Minocqua, Wisconsin.

Herrero, S. 1985. Bear attacks. Winchester Press. Piscataway, N.J.

Kolenosky, G.B. and S.M. Strathearn. 1987. Black bear. Pages 443–454 in Wild Furbearer Management and Conservation in North America. Ontario Trappers Association. North Bay.

The Canadian Wildlife Service

The Canadian Wildlife Service of Environment Canada handles wildlife matters that are the responsibility of the Canadian government. These include protection and management of migratory birds as well as nationally significant wildlife habitat. Other responsibilities are endangered species, control of international trade in endangered species, and research on wildlife issues of national importance. The service cooperates with the provinces, territories, Canadian Parks Service, and other federal agencies in wildlife research and management.

For more information about the Canadian Wildlife Service or its other publications, please write to:

Publications
Canadian Wildlife Service
Ottawa, Ontario
KIA OH3
(819) 997-1095

ENVIRONMENTAL CHOICE · CHOIX ENVIRONNEMENTAL

Over 50% recycled paper including 10% post-consumer fibre.

M – Official mark of Environment Canada

Canada

Environmental Citizenship
Écocivisme

The goal of the Environment Citizenship campaign is to help Canadians learn about their responsibility to protect the environment and to encourage them to take action towards that end.

Également disponible en français sous le titre *L'ours noir*

Published by Authority of the Minister of Environment
©Minister of Supply and Services Canada, 1968, 1970, 1973, 1984, 1988, 1993
Catalogue No. CW69-4/8-1993E
ISBN 0-662-20444-1
Text: George Kolenosky
Revised by George Kolenosky, in 1992
Photo: Ed Cesar

Service canadien de la faune

La faune de l'arrière-pays

L'ours noir

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Un membre de la famille Conservation et Protection

Comment distinguer un ours noir d'un grizzli

Ours noir



Grizzli



L'ours noir *Ursus americanus*, désigné aussi sous le nom de baribal en France, est, de nos jours, l'un des animaux sauvages les plus connus en Amérique du Nord. Pour le campeur, il est à la fois une source d'ennuis et un élément fascinant de la vie en plein air. La plupart des touristes sont fort déçus s'ils n'ont pas la chance d'entrevoir un ours pendant leur séjour dans les parcs provinciaux ou nationaux du Canada.

L'ours noir appartient à la famille des ursidés, dont on trouve des représentants dans presque tout l'hémisphère boréal et dans le nord de l'Amérique du Sud. En Amérique du Nord, les autres membres de cette famille sont l'ours brun (grizzli) et l'ours blanc (polaire), qui sont tous deux beaucoup plus gros que l'ours noir.

Sur le continent nord-américain, l'ours noir occupe un vaste territoire allant d'est en ouest, jusqu'en Alaska au nord, et jusqu'au Mexique au sud. Il est absent de l'Île-du-Prince-Édouard, du nord de l'Alberta et de la Saskatchewan ainsi que de l'extrême nord de l'Ontario. Son aire de répartition est figurée sur la carte.

Bien qu'il fréquente divers habitats, l'ours noir préfère les forêts denses et les broussailles touffues. Mais c'est probablement dans les forêts mixtes de conifères et de feuillus qu'il vit en plus grand nombre. Dans les habitats qui lui sont favorables, on dénombre un ours par 3 ou 4 km^2. Il est difficile d'évaluer la population, car l'ours noir est un animal timide et discret. Selon les estimations récentes, la population continentale compterait 500 000 bêtes, à quelque 200 000 individus près!

Caractéristiques physiques

L'ours noir est un mammifère trapu et massif. À l'âge adulte, il mesure quelque 150 cm de longueur et de 100 à 120 cm de hauteur au garrot. Il possède une tête de grosseur moyenne, un profil facial presque droit, un museau pointu, des naseaux allongés et une langue d'une grande agilité. Ses lèvres, contrairement à celles d'autres bêtes sauvages, comme le loup ou le lynx roux, se retroussent sur les gencives et sont très mobiles, ce qui lui permet de happer de minuscules baies ou même des fourmis. Ses yeux sont petits et ses oreilles arrondies. Sa queue est très courte et à peine visible, et ses pieds sont couverts d'une épaisse fourrure. À l'instar de l'être humain, l'ours est plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche sur la plante des pieds. Les pattes sont garnies de cinq doigts armés de griffes puissantes, recourbées et non rétractiles, dont il se sert pour creuser et arracher les racines, les souches et les troncs d'arbres lorsqu'il est en quête de nourriture.

En raison de sa silhouette trapue, l'ours noir paraît beaucoup plus lourd qu'il ne l'est en réalité. Les mâles adultes pèsent généralement 135 kg, mais des spécimens de plus de 290 kg ont été signalés. La femelle est beaucoup plus petite que le mâle et pèse en moyenne 70 kg.

En règle générale, l'ours noir a un pelage noir et un museau brunâtre; une tache blanche orne souvent sa poitrine ou la partie inférieure de sa gorge. Même si la couleur noire est la plus répandue, certains ont le pelage brun, brun foncé, cannelle, bleu-noir ou même blanc. Les albinos sont rares. Les ours au pelage clair sont plus nombreux dans l'Ouest et dans les montagnes que dans l'Est. Ces différentes teintes peuvent se rencontrer chez les oursons d'une même portée mais, habituellement, les petits sont tous de la même couleur que leur mère.

Affligé d'une vue assez faible, l'ours noir possède toutefois une ouïe et un odorat remarquables. L'animal en alerte cherche habituellement à se placer sous le vent par rapport à l'intrus et ce, pour mieux l'identifier à l'odeur. Dans des conditions atmosphériques favorables, il peut repérer de loin, grâce à l'odeur qui s'en dégage, la charogne dont il est friand. Il arrive souvent que l'ours noir se tienne sur ses pattes arrière et renifle le vent en quête d'odeurs délectables.

L'ours noir se déplace d'un pas lourd et lent, mais il peut accélérer considérablement son allure au besoin. Sur de courtes distances, il peut atteindre une vitesse de 55 km/h. Habile nageur, il traverse souvent des cours d'eau et des petits lacs.

L'ours noir est aussi un excellent grimpeur. Lorsqu'ils sont apeurés, les jeunes courent vers l'arbre le plus proche. Ils l'escaladent par petits bonds rapides, enserrant le tronc de leurs pattes de devant et poussant avec celles de derrière. Ils descendent à reculons et se laissent souvent choir sur le sol d'une hauteur de 4,5 m. Ils disparaissent ensuite dans les broussailles, apparemment peu ébranlés par leur descente précipitée.

Bien qu'on l'entende rarement, l'ours noir émet plusieurs cris distincts : grognements hargneux, plaintes et reniflements divers. La mère avertit ses oursons d'un danger par un « jappement » bruyant suivi d'une plainte ou d'un geignement. Lorsqu'ils sont apeurés, les petits « pleurent » un peu à la façon d'un bébé.

Aire de répartition de l'ours noir

Mode de vie

L'ours noir mène une vie essentiellement solitaire, mais un lien étroit unit la femelle à ses petits. Le mâle rompt provisoirement sa solitude à l'époque du rut lorsqu'il cherche à s'accoupler. L'accouplement a lieu en juin ou au début de juillet; la femelle met bas au mois de janvier ou de février suivant, pendant la période d'hivernage.

En règle générale, la portée compte deux petits, parfois un seul, parfois jusqu'à quatre. À la

Empreintes d'ours telles qu'elles apparaissent sur la piste



naissance, les oursons mesurent de 15 à 20 cm de long et pèsent un peu plus de 225 g. Comparativement aux autres mammifères, le rapport entre le poids des nouveau-nés et celui de la mère est très faible. Par exemple, une femme de 70 kg peut s'attendre à ce que son nouveau-né pèse environ 3 kg, soit 12 fois la masse d'un ourson à la naissance! Les petits se développent rapidement et sont très actifs au moment où ils quittent la tanière, accompagnés de leur mère, au printemps. À l'âge d'un an, ils pèsent de 13 à 27 kg et à peine plus à deux ans. Normalement, ils restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 16 ou 17 mois. On estime à environ 30 % les chances de survie des oursons qui perdent leur mère dès le premier été comparativement à quelque 80 % pour ceux qui n'ont pas à subir cette épreuve.

En captivité, le mâle et la femelle peuvent parvenir à la maturité sexuelle vers l'âge de trois ou quatre ans; dans leur milieu naturel toutefois, cette maturité est plus tardive. Alors que le mâle continue de croître jusqu'à l'âge de sept ans, la femelle cesse de se développer un peu plus tôt. L'ours noir peut vivre jusqu'à 25 ou 30 ans, mais la plupart des ours vivent moins de 10 ans dans la nature.

À l'automne, lorsque les jours raccourcissent et que le temps se refroidit, l'animal se met en quête d'une tanière pour hiverner. (Note du rédacteur : Le terme « hiverner » signifie se mettre à l'abri pour l'hiver; noter la distinction de sens d'avec le terme « hiberner », au sens propre : passer l'hiver dans un état d'engourdissement, utilisé un peu plus bas.) Il choisit ordinairement une vieille souche d'arbre, un tronc renversé ou une grotte à flanc de colline. La plupart du temps, cette tanière est juste assez grande pour qu'il puisse s'y blottir. Contrairement au mâle, la femelle tapisse généralement le sol avec des herbes, des fougères et des feuilles. Habituellement, elle commence à hiverner plus tôt que le mâle, qui attend souvent les premières chutes de neige avant de gagner sa tanière.

Des études récentes de la physiologie de l'ours noir ont révélé que celui-ci, une fois retiré dans sa tanière, présente toutefois à certains égards le comportement typique d'un véritable hibernant. En effet, si la température corporelle ne s'abaisse que légèrement, le rythme cardiaque, lui, ralentit considérablement. En outre, contrairement à de nombreux petits mammifères hibernants, l'ours noir n'éprouve pas le besoin de se nourrir ou de déféquer, mais survit grâce à ses seules réserves de graisse. Cependant ce ne sont pas de véritables hibernants, car on peut les réveiller si on les dérange suffisamment. Lorsque le temps devient exceptionnellement doux en hiver, certains peuvent même quitter leur tanière pendant de courtes périodes.

Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, l'ours sort de sa tanière et se met en quête de nourriture. Durant l'hiver, il peut avoir perdu jusqu'à 30 % de son poids normal. Pour la plupart, la cure d'amaigrissement forcé se poursuit durant les premiers mois de l'été jusqu'à l'apparition des baies à la mi-juillet.

Déplacements et nourriture

Les ours noirs peuvent parcourir de grandes distances. Les biologistes qui en capturent pour les remettre en liberté 80 km plus loin ont parfois la surprise de retrouver plus tard ces mêmes animaux dans leur domaine vital originel. Cependant, la femelle occupe habituellement un domaine vital assez restreint. Le domaine du mâle adulte couvre celui de plusieurs femelles. Comme la majorité des animaux sauvages, l'ours noir choisit une piste qu'il emprunte ensuite régulièrement pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Les chasseurs d'autrefois le savaient, car ils tendaient souvent leurs pièges en travers de ces pistes bien battues.

L'activité de l'ours noir varie d'une région à l'autre en fonction d'un certain nombre de facteurs, dont les activités humaines. Ainsi, dans les régions plus reculées, il s'affaire habituellement de l'aube jusqu'au crépuscule, tandis que dans les secteurs plus touchés par les activités humaines, il circule surtout la nuit afin d'éviter tout contact avec l'être humain. Bien sûr, certains individus recherchent la présence des humains dans l'espoir de décrocher un repas gratuit.

L'ours noir est omnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qui lui tombe sous la dent. Les plantes forment l'essentiel de son régime alimentaire, surtout à la fin de l'été et à l'automne où abondent les baies et les noix. Ses fruits favoris sont les bleuets, les fraises, les baies de shépherdie, d'amélanchier et de sureau, les cerises noires et les pommes. Il affectionne aussi les glands, les noisettes et les faînes. Il se régale également de certains insectes, comme les fourmis et les sauterelles, et il lui arrive de retourner des troncs d'arbres, de vieilles souches et des pierres pour en trouver. Il consomme aussi des poissons, de petits mammifères et, parfois, des oiseaux. Au printemps, certains ours s'attaquent aux faons des orignaux, des cerfs, des wapitis et des caribous. Son goût pour la charogne s'accroît en proportion du degré de décomposition de la carcasse. Un arbre contenant du miel constitue bien entendu un vrai régal. Enfin, comme l'ours noir boit beaucoup, il se tient habituellement à proximité d'une étendue d'eau.

Causes de mortalité

La longévité de l'ours noir peut varier de 20 à 25 ans, mais peu d'ours vivent aussi longtemps dans leur milieu naturel. Dans les régions où l'ours est chassé, la chasse autorisée constitue l'une des causes majeures de mortalité chez l'espèce, notamment chez les ours âgés de deux ans ou plus. Les mâles sont habituellement tués avant les femelles, car ils sont plus audacieux et se déplacent sur de plus grandes distances. Les femelles deviennent plus vulnérables si la chasse s'intensifie. Les jeunes ours des populations chassées et non chassées meurent de faim, des suites d'accidents ou de prédation. Leurs prédateurs sont les ours adultes et parfois les loups et les lynx.

Récemment, la demande accrue de vésicules biliaires, de pattes et d'autres parties de l'ours, réputées avoir des propriétés médicinales et aphrodisiaques, a fait naître des craintes quant à la chasse illégale à l'ours. Dans certaines parties du

Les ours et l'art du graffiti

On estime que les griffures et autres marques faites par les ours sur les arbres leur servent de moyen de communication. Les mâles adultes sont ceux qui ont davantage recours à ce type de langage, présumément pour signaler leur présence à des partenaires ou à des rivaux potentiels. C'est à la fin du printemps et au début de l'été (de la mi-juin à la mi-juillet) au moment de la saison des amours que ces marques sont les plus nombreuses.



globe, une vésicule déshydratée peut valoir jusqu'à 50 000 $.

Certains ours noirs sont les hôtes de parasites comme le ténia et l'ascaride, qui semblent toutefois avoir peu d'effets sur la santé de ces animaux. En général, les ours noirs sauvages sont très peu parasités. Du point de vue de l'hygiène publique, la trichinose, qui est causée par la trichine, un ver nématode filiforme, est probablement la maladie parasitaire la plus importante chez l'ours. Puisque l'être humain y est vulnérable, il importe de bien cuire la viande d'ours avant de la consommer.

Rapports avec l'être humain

L'attitude de l'être humain envers l'ours a toujours été marquée de prudence et de respect, voire de vénération dans les temps anciens. De nos jours, de nombreux Amérindiens vénèrent encore cet animal et témoignent d'une très grande admiration pour le chasseur qui a réussi à en abattre un.

Aux premiers temps de la colonisation européenne, les chasseurs d'ours gagnaient leur vie en chassant et en piégeant les ours, les loups et les couguars à cause d'un danger présumé pour le bétail et peut-être pour les colons. En réalité, la plupart des ours noirs s'attaquent rarement à d'autres grands mammifères et ne peuvent être considérés comme des prédateurs au même titre que les loups, les belettes ou les ours blancs. De nos jours, ils sont recherchés comme gibier en raison de leur grande taille et de leur nature farouche et parce qu'ils représentent un véritable défi pour les chasseurs. Apprêtée avec soin, leur viande constitue aussi un mets de choix pour bon nombre d'amateurs de viande de gibier.

Au Canada et en Alaska, il existe actuellement deux saisons de chasse légale à l'ours noir, soit au printemps et à l'automne; toutefois, en raison de la surexploitation de l'espèce, il est interdit de chasser l'ours noir au printemps dans la plupart des 48 États américains du sud.

Les ours noirs raffolent des ordures ménagères et se rassemblent souvent dans les décharges. C'est ainsi qu'ils s'approchent parfois des humains qui prennent plaisir à surveiller le manège de ces animaux en train de manger, surtout celui des oursons. Ils sont, bien sûr, moins amusants lorsqu'ils s'attaquent au repas des pique-niqueurs.

La plupart des ours noirs étant très timides et discrets, ils évitent habituellement de s'approcher des êtres humains. On sait toutefois qu'ils peuvent s'attaquer aux humains, mais de tels incidents sont très rares. Les auteurs de ces attaques sont généralement des ours qui se sont nourris dans les poubelles ou qui sont en très mauvaise condition physique en raison de leur âge ou à la suite d'une maladie ou de blessures.

Il arrive parfois que les ours s'en prennent au bétail ou aux ruches des apiculteurs. Ordinairement, c'est le fait d'une ou deux bêtes dont il suffit de se débarrasser pour éliminer le problème. Lorsqu'on aperçoit des ours dans leur milieu naturel, il faut se rappeler que ce sont des animaux sauvages qu'il faut traiter avec prudence. Il faut s'abstenir de les nourrir. Habituellement, l'animal bat promptement en retraite lorsqu'on s'en approche, mais il faut éviter les risques inutiles, car l'ours, tout comme l'être humain, peut être imprévisible. Même s'il est un sujet d'observation et de photographie très intéressant, il vaut mieux le tenir à distance.

En 1992, pour limiter la chasse illégale de l'ours noir et le commerce international illicite des vésicules biliaires d'ours sauvages (y compris les ours asiatiques en danger de disparition), les 115 pays (dont le Canada) signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont convenu d'inclure l'ours noir dans la liste de l'Annexe II de la Convention. Depuis, tout chasseur qui désire exporter une partie quelconque d'un ours noir d'un pays membre de la CITES doit obtenir une licence d'exportation de la CITES de ce pays.

Ouvrages à consulter

Banfield, A.W.F. 1977. Les mammifères du Canada. 2e éd. Presses de l'Université Laval et University of Toronto Press. Pp. 283–286.

Delaunois, A. 1991. Les mammifères de chez nous. Éditions Héritage Inc. Saint-Lambert (Qué.). Pp. 143–146.

Dubois, P. 1992. L'ours noir. Une vieille connaissance encore mal connue. *Dans* Forêt Conservation. Magazine de l'AFQ et des clubs 4-H du Québec. Québec (Qué.). (59)6:24–27.

Le Service canadien de la faune

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada s'occupe des questions de compétence fédérale touchant la faune.

Pour de plus amples renseignements sur le Service canadien de la faune ou ses publications, veuillez écrire à :

Publications
Service canadien de la faune
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
(819) 997-1095

Also available in English under the title *Black Bear*

Publié en vertu de l'autorisation du ministre de l'Environnement
©Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1968, 1970, 1973, 1984, 1993
N° de catalogue CW69-4/8-1993F
ISBN 0-662-98179-0
Texte : George Kolenosky
Révisé par George Kolenosky, en 1992
Photo : Ed Cesar

CHOIX ENVIRONNEMENTAL · ENVIRONMENTAL CHOICE · M

Plus de 50 p. 100 de papier recyclé dont 10 p. 100 de fibres post-consommation.

M – Marque officielle d'Environnement Canada

Écocivisme
Environmental Citizenship

Le Programme d'écocivisme vise à aider les Canadiens et les Canadiennes à prendre conscience de leurs responsabilités en matière de protection de l'environnement et à prendre des mesures concrètes.

Canada